

Effect of a condolence letter on grief symptoms among relatives of patients who died in the ICU: a randomized clinical trial

Nancy Kentish-Barnes¹, Sylvie Chevret², Benoît Champigneulle³, Marina Thirion⁴, Virginie Souppart¹, Marion Gilbert⁵, Olivier Lesieur⁶, Anne Renault⁷, Maité Garrouste-Orgeas⁸, Laurent Argaud⁹, Marion Venot¹⁰, Alexandre Demoule¹¹, Olivier Guisset¹², Isabelle Vinatier¹³, Gilles Troché¹⁴, Julien Massot¹⁵, Samir Jaber¹⁶, Caroline Bornstain¹⁷, Véronique Gaday¹⁸, René Robert¹⁹, Jean-Philippe Rigaud²⁰, Raphaël Cinotti²¹, Mélanie Adda²², François Thomas²³, Laure Calvet²⁴, Marion Galon¹, Zoé Cohen-Solal¹, Alain Cariou²⁵, Elie Azoulay^{1,26*} and Famirea Study Group

Intensive Care Med (2017) 43:473–484

ICUで死亡した患者の家族の悲嘆症状に対するお悔やみの手紙の効果
: 無作為化臨床試験

慈恵ICU勉強会

2017年5月9日

急性・重症患者看護専門看護師

坂木 孝輔